

## RIEMANNŮV (URČITÝ) INTEGRÁL

## 8.1. Riemannův (určitý) integrál

Předpokládáme, že čtenář zná teorii Riemannova integrálu v rozsahu například kapitoly 6, oddíly 6.6. – 6.15. v [KI]. Pro jeho pohodlí připomeneme základní definice a věty.

**Definice 8.1.** Jestliže supremum dolních součtů (dolní integrál) funkce  $f$  na intervalu  $\langle a, b \rangle$  je rovno infimu horních součtů (horní integrál), pak jejich společnou hodnotu nazýváme *Riemannovým (určitým) integrálem* funkce  $f$  na intervalu  $\langle a, b \rangle$  a označujeme jej  $\int_a^b f(x) dx$ .

**Definice 8.2.** Pro  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $b < a$  klademe

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} - \int_b^a f(x) dx$$

(pokud integrál napravo existuje) a pro  $a \in \mathbb{R}$

$$\int_a^a f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} 0.$$

**Definice 8.3.** Integrálem komplexní funkce  $f$  na intervalu  $\langle a, b \rangle$  rozumíme

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b \operatorname{Re} f(x) dx + i \int_a^b \operatorname{Im} f(x) dx,$$

pokud integrály napravo existují.

**Věta 8.1.** *I. Platí*

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx,$$

pokud integrály napravo existují a  $\alpha, \beta$  jsou konstanty.

II. Je

$$\int_a^b C dx = C(b - a),$$

kde  $C$  je konstantní funkce rovná číslu  $C$ .

**Věta 8.2.** (postačující podmínky existence integrálu) *Je-li  $f$  spojitá nebo je  $f$  monotónní a omezená na intervalu  $\langle a, b \rangle$ , pak integrál  $\int_a^b f(x) dx$  existuje.*

**Věta 8.3.** *Integrál nezávisí na hodnotách funkce v konečně mnoha bodech.*

**Věta 8.4.** *Platí*

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx,$$

pokud integrál přes největší z intervalů  $\langle a, b \rangle$ ,  $\langle a, c \rangle$ ,  $\langle c, b \rangle$  existuje.

**Věta 8.5.** *Má-li  $f$  integrál, má jej i  $|f|$  a platí*

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f|(x) dx,$$

přičemž uvedená nerovnost platí pouze pro  $a \leq b$ . Z integrovatelnosti  $|f|$  obecně neplyne integrovatelnost  $f$ .

**Věta 8.6.** *Mají-li  $f$  i  $g$  integrál na intervalu  $\langle a, b \rangle$  a  $f(x) \leq g(x)$  pro  $x \in \langle a, b \rangle$ , pak platí*

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Zde je podstatné, že  $a \leq b$ .

**Věta 8.7.** Má-li  $f$  integrál na intervalu  $\langle a, b \rangle$ , pak jej má na každém intervalu  $\langle c, d \rangle \subset \langle a, b \rangle$ .

**Věta 8.8.** Existuje-li integrál  $\int_a^b f(x) dx$ , pak pro každé  $c$  mezi  $a$  a  $b$  je funkce

$$F_c(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_c^x f(t) dt$$

spojitá na  $\langle a, b \rangle$ . Je-li  $f$  spojitá v bodě  $x_0 \in \langle a, b \rangle$ , pak je  $F'_c(x_0) = f(x_0)$ . Je-li  $f$  spojitá na  $\langle a, b \rangle$ , pak je  $F_c$  primitivní k  $f$  na  $\langle a, b \rangle$ .

Základem pro výpočet Riemannova integrálu je následující věta:

**Věta 8.9.** (Newtonova – Leibnizova formule) Je-li  $f$  spojitá na  $\langle a, b \rangle$  a  $F$  je k ní na  $\langle a, b \rangle$  primitivní, pak platí

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \stackrel{\text{def}}{=} [F(x)]_a^b.$$

Tento vzorec platí i pro  $b \leq a$ , je-li  $f$  spojitá a  $F$  k ní primitivní na  $\langle b, a \rangle$ .

**Věta 8.10.** (integrace per partes) Mají-li  $u$  a  $v$  spojitě derivace na  $\langle a, b \rangle$ , pak je

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Platí to i pro  $b \leq a$  se stejnou modifikací předpokladů jako v předchozí větě.

**Věta 8.11.** (o substituci) Necht' funkce  $\varphi$  má spojitou derivaci na  $\langle a, b \rangle$  a zobrazuje tento interval na interval  $J$ . Necht' funkce  $f$  je spojitá na  $J$ . Potom platí

$$\int_{\varphi(b)}^{\varphi(a)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Je-li  $\varphi$  navíc ryze monotónní, pak body  $\varphi(a)$ ,  $\varphi(b)$  jsou koncové body intervalu  $J$ , k  $\varphi$  existuje na  $J$  inverzní funkce  $\varphi^{-1}$  a pro každé  $\alpha$ ,  $\beta \in J$  je

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\varphi^{-1}(\alpha)}^{\varphi^{-1}(\beta)} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

*Poznámka 8.1.* (analogická poznámce 7.3. z kapitoly 7) Máme-li spočítat integrál  $\int_a^b f(x) dx$ , můžeme novou integrační proměnnou zavádět dvojným způsobem: 1)  $x = \varphi(t)$  ( $dx = \varphi'(t) dt$ ). V tomto případě musíme předpokládat, že  $\varphi$  je ryze monotónní, abychom mohli určit meze pro  $t$ :  $\varphi^{-1}(a)$ ,  $\varphi^{-1}(b)$ . 2)  $y = \psi(x)$ . V tomto případě nemusíme mít  $\psi$  ryze monotónní, ale musíme umět vyjádřit  $f(x)$  ve tvaru  $h(\psi(x))\psi'(x)$  s nějakou funkcí  $h$ . Meze pro  $y$  pak budou  $\psi(a)$ ,  $\psi(b)$  a použijeme fakticky první vzoreček z věty 8.11. se záměnou  $x$  místo  $t$ ,  $y$  místo  $x$  a  $\psi$  místo  $\varphi$ <sup>17</sup>. Je-li  $\psi$  navíc ryze monotónní s nenulovou derivací, pak z  $y = \psi(x)$  vyjádříme  $x$  ve tvaru  $x = \psi^{-1}(y)$  a postupujeme jako v bodu 1).

*Poznámka 8.2.* Při počítání Riemannova integrálu můžeme postupovat dvojným způsobem: 1) Určíme nějak (per partes, substitucí, apod. – viz předchozí kapitola) primitivní funkci  $F$  k funkci  $f$  na intervalu  $\langle a, b \rangle$  a užijeme Newtonův – Leibnizův vzorec. 2) Nebo budeme užívat věty 8.10. a 8.11. (tj. metodu per partes a substituční metodu pro určitý integrál). Oba postupy mají své přednosti a nedostatky. Při prvním postupu musíme někdy zbytečně vypisovat i ty členy, které po dosazení do Newtonovy – Leibnizovy formule dají nulu. Na druhé straně nemusíme pokaždé přepočítávat meze a také můžeme derivováním prověřit, zda jsme primitivní funkci určili správně. Tím jsme už vyjádřili přednosti a nedostatky druhého postupu.

**Příklad A.** Máme spočítat integrál

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos x dx.$$

1) Užijeme první postup (per partes):

$$\begin{aligned} \int x^2 \cos x dx &= x^2 \sin x - \int 2x \sin x dx = \\ &= x^2 \sin x - [2x(-\cos x) + \int 2 \cos x dx] = \\ &= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x \end{aligned}$$

---

<sup>17</sup>Nesmíme zapomenout, že funkce  $f$  musí být spojitá na  $\langle a, b \rangle$ : použijeme-li například formálně substituci  $y = \cos x$  na integrál  $\int_{-\pi/2}^{\pi/4} \frac{\sin x}{1-\cos x} dx$ , dostaneme integrál  $-\int_0^{\sqrt{2}/2} \frac{1}{1-y} dy$ , který existuje, zatímco původní integrál neexistuje.

(užili jsme dvakrát per partes: poprvé s  $u' = \cos x$ ,  $v = x^2$ , podruhé s  $u' = \sin x$ ,  $v = 2x$ ). Je proto

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos x \, dx = [x^2 \sin x]_0^{\pi} + [2x \cos x]_0^{\pi} - [2 \sin x]_0^{\pi} = 0 - 2\pi - 0 = -2\pi.$$

2) druhý postup:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x^2 \cos x \, dx &= [x^2 \sin x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2x \sin x \, dx = \\ &= -\{[2x(-\cos x)]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} 2 \cos x \, dx\} = -2\pi - 2[\sin x]_0^{\pi} = -2\pi. \end{aligned}$$

**Příklad B.** Spočtěme integrál

$$\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}} \, dx.$$

1) první postup: uděláme-li substituci

$$t = \sqrt{5-4x}, \quad t^2 = 5-4x, \quad x = \frac{5-t^2}{4}, \quad dx = -\frac{t}{2} \, dt,$$

dostaneme

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{5-4x}} \, dx &= \int \frac{5-t^2}{4} \frac{1-t}{2} \, dt = \\ &= \frac{1}{8} \int (t^2 - 5) \, dt = \frac{1}{8} (t^3/3 - 5t) = \frac{1}{8} \sqrt{5-4x} \left( \frac{5-4x}{3} - 5 \right). \end{aligned}$$

Dosazení do Newtonovy - Leibnizovy formule dá

$$\frac{1}{8} ((1/3 - 5) - 3(3 - 5)) = \frac{1}{8} (-14/3 + 6) = \frac{1}{8} \frac{4}{3} = \frac{1}{6}.$$

2) druhý postup: substituce  $t = \sqrt{5-4x}$  dá

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}} \, dx &= \frac{1}{8} \int_3^1 (t^2 - 5) \, dt = \frac{1}{8} [t^3/3 - 5t]_3^1 = \\ &= \frac{1}{8} (1/3 - 5 - 27/3 + 15) = \frac{1}{8} (1/3 + 1) = \frac{1}{8} \frac{4}{3} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$